1 mg

胰妥讚®注射劑

注射衛教單張

若有任何問題請洽詢本院糖尿病醫療團隊

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection
胰妥讚®注射劑

如何使用每週注射一次的胰妥讚®注射筆？



A 筆蓋
每次使用後請將筆套蓋回，以避免光線照射

B 注射筆視窗
檢查胰妥讚®注射筆中的溶液是不是透明無色。如果看起來混濁或變色，請勿使用注射筆。

C 劑量計數器
顯示您所設定的劑量

D 劑量設定鈕
轉動以設定劑量

E 給藥按鈕
持續按壓以完成注射

如何保存胰妥讚®？

使用前

- 請存放於冰箱冷藏 (2°C 至 8°C)，避免接觸冷卻元件。

使用中

- 請存放於 30°C 以下或冰箱冷藏 (2°C 至 8°C)。
- 使用中的保存期限：6 週。
- 請勿冷凍胰妥讚®，也不要使用冷凍過的胰妥讚®。
- 注射筆使用後必須套回注射筆蓋，以避免光線照射。

胰妥讚®投與方式

- 每週注射一次，可在一天中的任何時間注射，不論是否進食。
- 如果錯過一劑藥物，應在 5 天內儘快施打。
- 必要時可改變每週注射的日期，兩次注射之間應至少相隔 3 天 (超過 72 小時)。

胰妥讚®注射筆操作步驟影片

中文版　台語版

Reference: 胰妥讚®注射劑衛生福利部核准仿單
衛部菌疫輸字第 001107 號
僅供醫療專業人員針對胰妥讚®注射劑使用者衛教之用

novo nordisk®
台灣諾和諾德藥品股份有限公司
台北市大安區敦化南路二段 207 號 10 樓
電　話：(02)77049988
傳　真：(02)23770111
網址：http://www.novonordisk.com.tw

NNPTW/DM-DAE-01/ZYWO/02-2021©

胰妥讚®注射步驟

請參考胰妥讚®注射筆所附的完整使用說明



1 檢查注射筆，並裝上新的針頭

檢查胰妥讚®注射筆中的溶液是不是透明無色。如果看起來混濁或變色，請勿使用注射筆。

裝上新的針頭後，取下針頭的內、外蓋。



2 檢查排空

使用新的注射筆第一次注射前，請先檢查是否已排空。

轉動劑量設定鈕，直到劑量計數器顯示排空檢查符號（▪▪ ▬）。

按住給藥按鈕，直到劑量計數器顯示 0，針尖應該會看到一滴溶液。



3 設定劑量

將劑量設定鈕轉到 1 mg 刻度。

持續轉動直到劑量設定鈕停住，並顯示為 1 mg。

⚠ **請勿計算「喀嚓聲」次數。**

劑量計數器的選定劑量必須準確對齊指示線，才能確保劑量正確。

4 進行注射

將針尖刺入皮膚。

按住給藥按鈕，直到劑量計數器顯示 0，**可能聽到「喀嚓聲」。**

針尖先不要拔出，然後慢慢數到 6，以確保劑量完整注入。

將針頭從皮膚拔出。



5 移除針頭

從針頭前端套入針頭外蓋。

蓋緊針頭外蓋。

旋轉取下針頭，將針頭移除並丟棄。

將筆蓋套回注射筆。

胰妥讚®注射部位



最適合注射胰妥讚®的部位為大腿、腹部或上臂